

Agaricus

Section Rufescentes ou Agaricus

Anneau ascendant fragile

Chair légèrement brunissante

Agaricus bresadolanus Bohus

Synonyme : *Agaricus radicans* *Agaricus romagnesi*

Chapeau (5-10 cm de diamètre) couvert de mèches squameuses brunâtres

Anneau supère-simple-mince –fragile faiblement strié au-dessus

Chair épaisse se froissant de rouge

Pied court se prolongeant par un cordon mycélien

Odeur faible d'amande

Habitat : endroits herbeux-pelouses-parcs-bois de feuillus (sous robiniers)

Indigeste, il provoque des diarrhées

Agaricus cupreobrunneus (Schaeffer & Stein ex Moell) Pilat

Chapeau (5-10 cm de diamètre) fibrilleux à velouté brunâtre à pourpre avec le centre du chapeau un peu aplani

Lames serrées- anneau supère, simple, fugace

Chair légèrement rosissante

Stipe souvent aminci vers le bas

Habitat : prairies- dunes du littoral-bord de mer

Agaricus campestris L. : Fr.

Chapeau blanc à brunâtre (4-10 cm de diamètre) à la marge enroulée laineuse

Stipe effilé ou atténué à la base

Anneau étroit, floconneux, fragile, simple)

Odeur fongique

Habitat : pelouses, prairies

La couleur et l'aspect du chapeau très variable ont donné lieu à des variétés

Ex : squamulosa = à squamules brunes

Agaricus porphyrocephalus Moller

Chapeau 3-8 cm de diamètre, cuticule squamuleuse, laineuse brun rougeâtre à brun porphyre

Possède des fibrilles plus grossières que cupreobrunneus

Anneau pendant, mince, peu développé

Lames serrées, chair ferme

Habitat : pelouses humides, endroits herbeux

Agaricus moellerianus Bon

Synonyme : *Agaricus floccipes*

Chapeau (6-10 cm de diamètre) blanc crème

Anneau supère simple, fugace, arachnéen

Chair dure un peu rosissante

Stipe squamuleux ressemble à campestris (différence : l'odeur)

Ici odeur anisée –amande amère

Habitat prairies- lisières-bois herbeux

Agaricus pampeanus Spegazzini

Chapeau (6 -12 cm de diamètre) lisse à faiblement squamuleux, blanchâtre un peu jaunissant

Stipe court- trapu

Chair blanche faiblement rougissante

Anneau fibrilleux rapidement déchiqueté

Habitat : pelouses sèches

Agaricus subperonatus (Lange) Singer

Synonyme : *Agaricus villaticus* Agaric guêtré

Chapeau (7-12 cm de diamètre) à fines écailles ochracées à brunâtre et à marge légèrement dentelée

Anneau ascendant, complexe, membraneux odeur peu agréable (un peu de cèleri ?)

Habitat : zone herbeuse, abord des détritux terreux et végétaux

Ne pas consommer en vue de son habitat

Agaricus vaporarius (Persoon) Cappelli

Agaric des serres

Chapeau (10-14 cm de diamètre) squamuleux brun foncé

Anneau supérieur double

Stipe bulbeux

Odeur nauséuse – saveur acidulée puis désagréable

Chair rapidement colorée en brun rouge purpurin à la phénaline

Habitat terre – fumier – compost

Ne pas consommer